

เตือนภัยการระบาดของโรคพืชและแมลง

สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

รูปร่างลักษณะ

ชนิดปีกยาว

ชนิดปีกสั้น

เพศผู้



เพศเมีย



การควบคุมพื้นที่ ไม่ให้แพร่ระบาด

1 ควบคุมน้ำในนาข้าว โดยให้มีการระบายน้ำออกเป็นครั้งคราว เพราะความชื้นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

กลุ่มอารักขาพืช
ประจักษ์บุรี

2 การใช้สารฆ่าแมลงในระยะที่เป็นตัวเต็มวัยปีกยาว หรือช่วงที่แมลงอพยพเข้าในนาใหม่ ๆ ศัตรูธรรมชาติจะถูกทำลาย แต่ไข่ของเพลี้ยจะไม่ถูกทำลาย ทำให้ตัวอ่อนที่ฟักออกมา มีโอกาสรอดสูง

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ลักษณะการทำลาย

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เข้าทำลายต้นข้าวได้ทุกระยะ ตั้งแต่ข้าวเริ่มแตกกอ แตกกอเต็มที่ และระยะออกรวง ทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ก่อน้ำที่อาหาร บริเวณโคนต้นข้าวระดับเหนือผิวน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีอาการ

ใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูก
น้ำร้อนลวกแห้งตายเป็นหย่อม ๆ
เรียกว่า
" อากาโรไหม้ " (hopperburn)



กลุ่มอารักขาพืช
ประจักษ์บุรี



สารป้องกันกำจัด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ระยะข้าวตั้งท้องถึงระยะออกรวง
(ข้าวอายุ 61 - 80 วัน)

ไดโนทีฟูเมธ 10% WP

ไพมีโตรซิน 50% WG

ซิลฟอกซาฟลอร์ 50% WG

กลุ่มอารักขาพืช
ประจักษ์บุรี



สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก

เลขที่ 7/3 ถนนนาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
โทร. 043-779-190 , เว็บไซต์ : <https://mahasarakham.doae.go.th/nachueak>