

เตือนภัยการระบาดของโรคพืชและแมลง

สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ไรแดงมันสำปะหลัง



ไรแดงมันสำปะหลัง (*Tetranychus truncatus*) เป็นแมลงปากดูดที่ระบาดหนักช่วงหน้าแล้ง ดูดกินน้ำเลี้ยงใตใบ ทำให้ใบเหลืองซีดเป็นจุดขาว เส้นใบขีด

ลักษณะการทำลาย:

- อาการ: ใบเป็นจุดด่างขาวซีดเหมือนถูกทรายโรย, ใบแห้งกรอบ, ร่วงหล่น, ยอดไหม้, ต้นแคระแกร็น.
- ตำแหน่ง: ไรแดงมันสำปะหลังดูดกินที่หน้าใบ (ด้านบน) และสร้างเส้นใยบางๆ.
- ช่วงระบาด: มีกระบาดรุนแรงในฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง.



วิธีป้องกันและกำจัด:

1. การจัดการแปลง:

- หมั่นตรวจแปลงสม่ำเสมอ.
- เก็บทำลายใบที่มีอาการ หรือเผา.
- หลีกเลี่ยงการปลูกช่วงที่แล้งจัด.

2. ศัตรูธรรมชาติ: อนุรักษ์ ด้วงเต่า (*Stethorus sp.*) และไรตัวห้ำ.

3. สารเคมี (เมื่อระบาดรุนแรง):

- ไพรดาเบน 20% WP (10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร).
- สไปโรมีซีเฟน 24% SC (6-10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร).
- เฟนบูทาทิน ออกไซด์ 55% SC (10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร).
- เฮกซีไทอะซอกซ์ 1.8% EC (40-100 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร).
- ข้อควรระวัง: ไม่ควรใช้สารชนิดเดียวกันติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง ควรพ่นสลับชนิดเพื่อป้องกันการดื้อยา.



สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก

เลขที่ 7/3 ถนนนาเชือก-พยุหภูมิพิสัย ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
 โทร. 043-779-190 , เว็บไซต์ : <https://mahasarakham.doae.go.th/nachueak>